

**Bruksanvisning**

# DulcoSoft®

## Oral lösning makrogol 4000

**Graviditet och amning**  
Dulcosoft kan tas under graviditet och amning eftersom absorptionen av makrogol 4000 är försumbar och inte förväntas ge någon effekt på barnet. Om du är gravid eller ammar bör du ändå rådgöra med din läkare innan du använder Dulcosoft.

**Användning hos barn**  
Denna produkt ska inte användas till barn under 6 månaders ålder.

**Användning hos diabetiker**  
Dulcosoft är lämpligt för diabetiker. Lösningen innehåller inte socker.


**Användning av Dulcosoft med andra produkter**  
Makrogol 4000 ökar det osmotiska trycket i tarmen och kan på så vis ändra upptaget från tarmen av andra produkter som tas samtidigt. Informera din läkare eller apotekspersonal om du använder andra produkter.

Om du behöver tillsätta förtjockningsmedel i vätskor för att underlätta nedsväljning kan Dulcosoft motverka effekten av förtjockningsmedlet.

**3. Hur du använder Dulcosoft**  
Ta alltid Dulcosoft enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Prata med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.  
Dulcosoft är en lösning med neutral smak. Den kan därför blandas med valfri dryck, till exempel ett glas vatten eller annan vätska såsom fruktjuice eller te (ungefärl 150 ml).  
Om inte läkare förskrivit annat, är den rekommenderade dosen: **Vuxna och barn från 8 år:** 20–40 ml lösning dagligen (ger 10–20 g makrogol 4000), helst taget en gång på morgonen.  
Användning hos barn som inte fyllt 8 år bör helst ske i samråd med läkare.  
**Barn 4–7 år:** 16–32 ml lösning dagligen (ger 8–16 g makrogol 4000), helst taget en gång på morgonen.  
**Barn 2–3 år:** 8–16 ml lösning dagligen (ger 4–8 g makrogol 4000), helst taget en gång på morgonen.  
**Barn 6 månader – 1 år:** 8 ml lösning dagligen (ger 4 g makrogol 4000), helst taget en gång på morgonen.  
Dosen mäts upp i den bifogade mätkoppen och kan anpassas utifrån den effekt du får. Dosen kan anpassas inom det rekommenderade intervallet och kan tas varje eller var annan dag. Rätt dos är den längsta dos som ger dig normal tarmtömning.  
**Lägg märke till:**  
Dulcosoft fungerar vanligen inom ett till tre dygn. Kliniska studier visar att vid regelbunden användning erhålls vanligtvis tarmtömning en gång per dygn.  
Om förstopningen kvarstår under längre tid bör orsaken till förstopningen utredas. Barn bör inte använda Dulcosoft längre än 3 månader.  
**Om du tar mer än rekommenderad dos**  
Överdriven användning av Dulcosoft ger troligen diarré, buksmärta, uppblåsthet och kräkning som upphör när behandlingen avbryts eller dosen sänks. Större vätskeförluster på grund av diarré eller kräkning kan kräva behandling för att återställa elektrolytbalansen. Du bör i så fall kontakta läkare.  
**Om du glömmer att använda Dulcosoft**  
Ta inte dubbel dos för att kompensera ifall du missat en tidigare dos.

**4. Eventuella biverkningar**  
Biverkningarna är vanligen milda och övergående.  
**Biverkningar hos vuxna och barn:**  
Diarré, magsmärta, uppblåsthet, illamående, kräkningar, fekal inkontinens och gasbesvär.  
I sällsynta fall kan anafylaktisk chock, anafylaktisk reaktion, angioödem, nässelutslag, utslag och överkänslighet inträffa.

**Direction of running**



Example  
Technical information  
control code

Bonding area

**pack2edit**  
Digital - Packaging - Development

**SANOFI**

### File information

GMID code: 652383

Plant PM code: 10023427

Second Plant PM code: 23001447

Version of artwork: V1

PM type: PI

Market: DK / NO / SE

Format: 180 x 315 mm

Issue date of artwork: 22/Mar/2022

Print colors: Pan 357

Number of print colors: 1

Used font: Bliss Pro

Min. font size: 8 pt

p2e number: 931768-U03

### Technical colors

Diecut-Legendcase Free area Glue points

Om du får diarré, sänk dosen Dulcosoft eller avbryt behandlingen. Då upphör oftast diarrén.  
Vid diarré bör du överväga att kontakta din läkare för att se om du behöver behandling för att förebygga saltbrist orsakad av vätskeförlust.

Om du upplever att biverkningarna blir allvarliga eller om du noterar några biverkningar som inte är listade ovan, kontakta läkare eller apotekspersonal.

#### 5. Hur Dulcosoft ska förvaras

Förvara utom syn- och räckhåll för barn.  
Använd inte Dulcosoft efter utgångsdatumet som står på ytterkartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.  
Förvara Dulcosoft vid högst 25 °C och förvara den inte i kylskåp.

Använd Dulcosoft inom 6 veckor efter att den öppnats.

Läs bruksanvisningen innan användning.

#### 6. Övrig information

10 ml lösning innehåller 5 gram makrogol 4000.

Lösningen finns tillgänglig i förpackningsstorleken 100 ml och 250 ml.

Hjälppännen:  
Kaliumsorbitat (konserveringsmedel), makrogol 400, citronsyra, renat vatten.

Lämplig för personer med saltreducerad kost.

Glutenfri. Laktosfri. sockerfri

#### Bruksanvisning

# DulcoSoft®

Mikstur, oppløsning  
makrogol 4000



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen fordi den inneholder viktig informasjon som du må vurdere før du bruker dette produktet. Hvis du er usikker, eller hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

Dulcosoft er et medisinsk utstyr for behandling av symptomer på treg mage (forstoppelse) og for mykgjøring av hard avføring.

Ta vare på denne bruksanvisningen. Du kan få behov for å lese den igjen.

I denne bruksanvisningen finner du informasjon om:

1. Hva Dulcosoft er og hva det brukes mot
2. Hva du må vite før du bruker Dulcosoft
3. Hvordan du bruker Dulcosoft
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Dulcosoft
6. Ytterligere informasjon

#### 1. Hva Dulcosoft er og hva det brukes mot

Dulcosoft består hovedsakelig av makrogol 4000, som er et osmotisk avføringssmidde. Makrogol 4000 har stor evne til å binde vann. Den virker som en bærer for væsken (vannet) og forsinker opptak av vann fra tarmen slik at mengden vann i tykktarmen øker. Der mykgjøres den harde avføringen og volumet på avføringen øker. Dette fører til økt bevegelse i tarmen og letter avføringen og lindrer hard mage (forstoppelse) og uregelmessig tarmfunksjon på en skånsom og effektiv måte. Makrogol 4000 har en ren fysisk virkningsmåte: den tas praktisk talt ikke opp i kroppen og skiller ut igjen uforandret.

Dulcosoft brukes for:

- behandling av symptomer på treg mage (forstoppelse)
- mykgjøring av hard avføring

#### 2. Hva du må vite før du bruker Dulcosoft®

Bruk ikke Dulcosoft ved:

- overfalsomhet overfor makrogol 4000 eller noen av de andre innholdsstoffene i dette produktet (se avsnitt 6, Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon)
- alvorlig betennelsessykdom i tarmen (som ulcerös kolit, Crohns sykdom) eller utvidelse av tarmen (toksisk megacolon)
- perforasjon (hull) eller risiko for perforasjon i mage-tarmkanalen

CE 0482

 Hälsa Pharma GmbH  
Maria-Goeppert-Straße 5  
D-23562 Lübeck, Tyskland

Distributör:  
STADA Nordic ApS,  
Marielundvej 46A,  
2730 Herlev, Danmark

Med mätkopp  
Tillverkare av mätkopp:  
Bormioli Pharma S.p.A.  
Corso Magenta 84  
20123 Milano (MI), Italien

CE 0373

Datum för information: mars 2020

Revisionsdatum: januari 2022

 Läs bruksanvisningen innan användning

5°C Förvaras vid högst 25°C och förvara den inte i kylskåp.

### 3. Hvordan du bruker Dulcosoft

Bruk alltid Dulcosoft nøyaktig som beskrevet i denne bruksanvisningen. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.

Dulcosoft er en opplosning uten smak. Den kan blandes direkte med valgfri drikke f. eks. et glass vann eller annen væske som fruktsaft eller te (ca. 150 ml).

Dersom ikke legen har forscrevet noe annet, er den anbefalte dosen:

#### Voksne og barn fra 8 år:

20–40 ml opplosning daglig (tilsvarer 10–20 g makrogol 4000), helst tatt som en enkeltdose om morgenen.

Bruk til barn under 8 år bør skje i samråd med lege.

#### Barn 4 til 7 år:

16–32 ml opplosning daglig (tilsvarer 8–16 g makrogol 4000), helst tatt som en enkeltdose om morgenen.

#### Barn 2 til 3 år:

8–16 ml opplosning daglig (tilsvarer 4–8 g makrogol 4000), helst tatt som en enkeltdose om morgenen.

#### Barn 6 måneder til 1 år:

8 ml opplosning daglig (tilsvarer 4 g makrogol 4000), helst tatt som en enkeltdose om morgenen.

Dosen måles opp ved å bruke målebegeret som følger med pakningen og kan tilpasses ut ifra effekten som oppnås. Innenfor anbefalt doseområde kan doses tilpasses ditt individuelle behov og kan tas daglig eller annenhver dag. Riktig dose er den laveste doses som gir regelmessig og myk avføring.

#### Vær oppmerksom på:

Dulcosoft virker vanligvis etter ett til tre døgn. Kliniske studier viser at avføringshyppigheten ved regelmessig bruk pleier å være en gang daglig.

Dersom forstoppelsen vedvarer, bør årsaken til forstoppelsen undersøkes. Barn bør ikke ta Dulcosoft i mer enn 3 måneder.

#### Dersom du tar mer enn anbefalt dose

Overdrene bruk av Dulcosoft vil sannsynligvis gi diaré, magesmerter, oppblåst mage og oppkast som går over når behandlingen avbrytes eller doses reduseres. Stort væsketap som følge av diaré eller oppkast kan kreve korrigering av elektrolyttforstyrrelser. I slike tilfeller må du kontakte lege.

#### Dersom du har glemt å ta Dulcosoft

Ikke ta en dobbelt dose med Dulcosoft hvis du glemte å ta forrige dose.

### 4. Mulige bivirkninger

Bivirkningene er vanligvis milde og forbigående.

#### Bivirkninger hos voksne og barn:

Diaré, magesmerter, oppblåst mage, kvalme, oppkast, problemer med å holde på avføringen og luft i magen.

I sjeldne tilfeller kan anafylaktisk sjokk, anafylaktisk reaksjon, angioødem, elveblest, utslett og overfølsomhet forekomme.

#### Brugsanvisning

Dersom du får diaré, bør du redusere doses med Dulcosoft eller avbryte behandlingen. Diaréen vil da vanligvis gå over. Ved diaré bør du vurdere å kontakte lege da du kan ha behov for behandling for å forhindre tap av salter (elektrolytter) som følge av væsketap.

Kontakt lege eller apotek dersom bivirkningene blir alvorlige, eller dersom du opplever bivirkninger som ikke er nevnt i denne bruksanvisningen.

### 5. Hvordan du oppbevarer Dulcosoft

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Dulcosoft etter utløpsdatoen som er angitt på esken.

Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevar Dulcosoft ved høyst 25 °C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.

Brukes innen 6 uker etter at flasken er åpnet.

Les bruksanvisningen før bruk.

### 6. Ytterligere informasjon

10 ml Dulcosoft mikstur inneholder 5 g makrogol 4000. Miksturen finnes i pakningsstørrelsen 100 ml og 250 ml.

#### Hjelpestoffer:

Kaliumsorbit (konserveringsmiddel), makrogol 400, sitronsyre, renset vann.

Egnet for pasienter på saltfattig diett.

Glutenfri. Laktosefri. Sukkerfri.

**€0482**

 Hälsa Pharma GmbH  
Maria-Goeppert-Straße 5  
D-23562  
Lübeck, Tyskland

#### Distributør:

STADA Nordic ApS, Marielundvej 46A, 2730 Herlev, Danmark

#### Med målebeger

#### Tilvirker av målebeger:

Bormioli Pharma S.p.A.

CORSO MAGENTA 84

20123 Milano (MI), Italia

**€0373**

Informasjon datert: mars 2020

Revidert dato: januar 2022

 Les bruksanvisningen før bruk.

 Oppbevares ved høyst 25 °C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.

**DulcoSoft®**  
Oral opplosning  
macrogol 4000



Læs denne brugsanvisning grundigt, inden du begynder at bruge dette produkt, da den indeholder vigtige oplysninger. Er du i tvivl, eller har yderligere spørgsmål, så spør din læge eller apotekspersonale.

Dulcosoft er et medicinsk udstyr, som behandler symptomer på træg mave (forstoppelse) og blødgør afføringen.

Gem denne brugsanvisning. Du kan få brug for at læse den igen.

#### Oversigt over brugsanvisningen

1. Hvad Dulcosoft er og hvad det skal bruges til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dulcosoft
3. Sådan skal du tage Dulcosoft
4. Mulige bivirkninger

5. Opbevaring af Dulcosoft
6. Ytterligere oplysninger

#### 1. Hvad Dulcosoft er og hvad det skal bruges til

Dulcosoft består hovedsageligt af macrogol 4000, et såkaldt osmotisk afførmingsmiddel. Macrogol 4000 har en stor evne til at binde vand. Det fungerer ved fastholde væske (vand) i tarmen og mindsker samtidig optagelsen af vand bort fra tarmen, herved øges mængden af vand i tarmen. Hård afføring blødgøres og øges. Dette fører til øget tarmbevægelse og letter tømning af tarmen, som lindrer træg mave (forstoppelse) og uregelmæssighed. Macrogol 4000 har udelukkende en fysisk virkningsmekanisme:



det optages stort set ikke i kroppen og udskilles uændret med afføringen.

**Dulcosoft anvendes til:**

- symptomatisk behandling af træg mave (forstoppelse)
- blædgørelse af afføring

**2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dulcosoft**

Tag ikke Dulcosoft ved:

- Overfolsomhed over for macrogol 4000 eller et af de øvrige indholdsstoffer (se kompositionen)
- alvorlig betændelsessygdom i tarmen (f.eks. colitis ulcerosa eller Crohns sygdom) eller udvidet tyktarm (toksisk megacolon)
- perforation eller risiko for perforation i mave eller tarm
- tarmslyng eller mistanke om blokering eller unormal forsævring (tarmstenose)
- mavesmerter med ukendt årsag.

Tag ikke Dulcosoft, hvis noget af ovennævnte gælder for dig. Hvis du er i tvivl, så kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Dulcosoft.

**Advarsler og forsigtighedsregler**

Før indtagelse af afføringssmidler, bør en eventuel sygdomstilstand udelukkes. Tag ikke Dulcosoft dagligt i en længere periode, hvis ikke årsagen til forstoppen er kendt. Ved længerevarende mavesmerter bør du kontakte lægen.

Hvis du har tendens til forstyrrelser i væske- og elektrolytbalance og samtidig får diarré, bør du være særlig opmærksom. Det er især vigtigt, hvis du er ældre, har nedsat lever- eller nyrefunktion eller tager vanddrivende medicin (diureтика). Det kan være nødvendigt at kontrollere elektrolytterne (mængden af salt i blodet).

Allergiske reaktioner (som f.eks. anafylaktisk shock, anafylaktisk reaktion, angioødem, nældefeber, udslæt og overfolsomhed) er rapporteret hos patienter, der tager produkter, som indeholder macrogol. **Hvis du oplever nogle af ovenstående tegn eller symptomer, skal du stoppe med at tage Dulcosoft og straks kontakte lægen.**

**Graviditet og amning**

Dulcosoft kan tages under graviditet eller amning, da optagelsen af macrogol 4000 er ubetydelig. Det forventes derfor ikke at påvirke barnet.

Hvis du er gravid eller ammer, bør du dog spørge din læge til råds, før du bruger Dulcosoft.

**Børn**

Dulcosoft må ikke bruges til børn under 6 måneder.

**Diabetikere**

Dulcosoft kan bruges af diabetikere. Opløsningen indeholder ikke sukker.

**Brug af andre produkter sammen med Dulcosoft**

Macrogol 4000 øger det osmotiske tryk i tarmen, og kan derfor påvirke optagelsen i tarmen af andre produkter, som tages samtidigt. Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre produkter.

Hvis du har brug for at tilsvare fortykningsmiddel til væsker for lettere at sluge dem, kan Dulcosoft modvirke effekten af fortykningsmidlet.

**3. Sådan skal du tage Dulcosoft**

Tag altid Dulcosoft som beskrevet i denne brugsanvisning. Er du i tvivl, så spørgr din læge eller apotekspersonalet.

Dulcosoft er en opløsning uden smag. Den kan blandes med en valgfri væske, f.eks. et glas vand eller anden væske såsom frugtjuice eller te (omkring 150 ml).

Med mindre andet er foreskrevet af lægen, er den anbefalede dosis:

**Voksne og børn fra 8 år**

20–40 ml opløsning dagligt (svarende til 10–20 g macrogol 4000), helst taget som en enkeltdosis om morgenen.

Må kun bruges til børn under 8 år efter aftale med lægen.

**Børn 4–7 år**

16–32 ml opløsning dagligt (svarende til 8–16 g macrogol 4000), helst taget som en enkeltdosis om morgenen.

**Børn 2–3 år**

8–16 ml opløsning dagligt (svarende til 4–8 g macrogol 4000), helst taget som en enkeltdosis om morgenen.

**Børn 6 måneder - 1 år:**

8 ml opløsning dagligt (svarende til 4 g macrogol 4000), helst taget som en enkeltdosis om morgenen.

**200 mg/ml**

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Denne opløsning indeholder 200 mg macrogol 4000 pr. ml.

Dosis afmåles vha. det medfølgende målebæger og kan justeres i forhold til den virkning, du får. Dosis kan justeres individuelt indenfor anbefalingerne og kan tages dagligt eller hveranden dag. Den rette dosis er den laveste dosis, som giver dig en regelmæssig tarmtømning.

**Bemærk at**

Dulcosoft virker normalt efter 1–3 døgn. Kliniske studier viser, at ved regelmæssig brug sker tarmtømning normalt en gang om dagen.

Hvis forstoppelsen varer længere, bør årsagen til forstoppelsen undersøges. Børn bør ikke tage Dulcosoft i mere end 3 måneder.

Hvis du har taget mere end den anbefalede dosis

Overdrevet brug af Dulcosoft kan give diarré, mavesmerter, oppustet mave og opkast. Dette ophører, når behandlingen stoppes eller dosis sættes ned.

Store væsketab på grund af diarré kan kræve genoprettelse af elektrolytbalancen. Du bør i så fald kontakte lægen.

**Hvis du glemmer at tage Dulcosoft**

Tag ikke en dobbeltdosis Dulcosoft, hvis du glemmer at tage den tidlige dosis.

**4. Mulige bivirkninger**

Bivirkningerne er generelt milde og forbipående.

**Bivirkninger hos voksne og børn**

Diarré, mavesmerter, oppustet mave, kvalme, opkast, svært ved at holde på afføringen (fækal inkontinens) og luft i maven. I sjeldne tilfælde kan anafylaktisk shock, anafylaktisk reaktion, angioødem, nældefeber, udslæt og overfolsomhed forekomme.

Ved diarré bør Dulcosoft behandlingen afbrydes eller dosis nedsættes. Dette vil sædvanligvis stoppe diarréen. Ved diarré bør du overveje at kontakte din læge for at se om du har behov for behandling mod saltmangel (elektrolytter) pga. væsketab.

Hvis nogle af bivirkningerne bliver alvorlige, eller hvis du oplever bivirkninger, som ikke står beskrevet ovenfor, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet.

**5. Opbevaring af Dulcosoft**

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Dulcosoft efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den næste måned.

Opbevares ved højst 25 °C. Må ikke opbevares i køleskab.

Bruges indenfor 6 uger efter åbning af flasken.

Læs brugsanvisningen inden brug.

**6. Yderligere oplysninger**

10 ml opløsning indeholder 5 g macrogol 4000.

Opløsningen findes i pakningsstørrelsen 250 ml.

**Hjælpestoffer:**

Kaliumsorbit (konserveringsmiddel), macrogol 400, citronsyre, renset vand.

Egnet til personer på en saltfattig diæt.

Glutenfri. Lactosefri. Sukkerfri.

**€0482**

 Hälsa Pharma GmbH  
Maria-Goeppert-Straße 5  
D-23562 Lübeck, Tyskland

**Distributør:**

STADA Nordic ApS,

Marielundvej 46A,

2730 Herlev, Danmark

**Med målebæger**

Fremstiller af målebæger:

Bormioli Pharma S.p.A.

CORSO Magenta 84

20123 Milano (MI), Italien

**€0373**

Informationen er dateret marts 2020.

Revisionsdato: Januar 2022

 Læs brugsanvisningen inden brug

 Opbevares ved højst 25°C. Må ikke opbevares i køleskab.

23001447

**10023427 - PI DULCOSOFT 125G/250ML LIQ BT1 M24 N3**

Plant: EM CHC EUROPE  
Packaging material code: 10023427  
Packaging material name: PI DULCOSOFT 125G/250ML LIQ  
BT1 M24 N3  
Second packaging material code: 23001447  
VISTAlink folder number: 4198867  
VISTAlink PDF version: 1

This document has been digitally signed by the following people within the VISTAlink system, following the sanofi group guidelines.

Reason	Signed by	Date
Market regulatory validation	Marina Balzina (Denmark CHC Stada regulatory team)	25/03/2022 13:49:24
Market regulatory validation	Marina Balzina (Norway CHC Stada regulatory team)	25/03/2022 13:49:45
Market regulatory validation	Marina Balzina (Sweden CHC Stada regulatory team)	25/03/2022 13:49:36
Legal Manufacturer Validation	Petra Hejcova-ext (EM CHC packaging team)	30/06/2022 14:03:35
Plant final technical validation	Petra Hejcova-ext (EM CHC packaging team)	30/06/2022 15:41:15
Plant ready to print	Petra Hejcova-ext (EM CHC packaging team)	30/06/2022 15:41:40